

WAYA Lax® Junior



PERORALNA RAZTOPINA | Makrogol 4000 125 g | 250 ml steklenica z odmerno posodico
Medicinski pripomoček

brez sladkorja | brez glutena

1. IDENTIFIKACIJA, SESTAVA IN OBSEG DELOVANJA MEDICINSKEGA PRIPOMOČKA

1.1 Opis in indikacije za uporabo

WAYA Lax® Junior peroralna raztopina je medicinski pripomoček na osnovi makrogola 4000. Medicinski pripomoček WAYA Lax® Junior peroralna raztopina se uporablja pri kronični zaprtosti, fekalomu (stanje vztrajne zaprtosti s kopičenjem blata na ravni danke (rektuma) in/ali debelega črevesa (kolona), ki se potrdi s telesnim pregledom trebuha in rektuma) ter pri zaprtosti z epizodičnimi ali kroničnimi kolikami.

1.2 Kontraindikacije in omejitve uporabe

Ne uporabite medicinskega pripomočka WAYA Lax® Junior peroralna raztopina, če imate znano preobčutljivost na sestavine, perforacijo in/ali zaporo prebavil, znane želodčne ali črevesne razjede, huda črevesna vnetna stanja, kot so Chronova bolezen, ulcerativni kolitis in toksični megakolon.

1.3 Sestava

Ena 250 ml steklenica vsebuje: makrogol 4000 125 g. Pomožne snovi: prečiščena voda, citronska kislina, aroma, natrijev benzoat, kalijev sorbat, sukraloza.

1.4 Način delovanja

WAYA Lax® Junior peroralna raztopina je medicinski pripomoček z odvajalnim delovanjem, ki z osmotskim mehanizmom ureja delovanje črevesa. V črevesu se ne absorbira in ne fermentira; ne draži sluznice in se izloči z blatom v nespremenjeni obliki. Zaradi afinitete (privlačnosti) medicinskega pripomočka WAYA Lax® Junior peroralna raztopina za vodo zmehča blato in olajša njegovo izločanje. Njegovo delovanje se s časom ne zmanjša.

1.5 Oblika pakiranja

Pakiranje vsebuje eno steklenico po 250 ml z odmerno posodico.

2. POSTOPEK UPORABE IN ODMERJANJE

Odrasli in otroci, starejši od 8 let:

- 20–40 ml raztopine na dan s kozarcem vode ali drugih tekočin, kot sta sok ali čaj (150 ml), priporočljivo v enem odmerku zjutraj.

Otroci, stari od 4 do 7 let:

- 15–30 ml raztopine na dan s kozarcem vode ali drugih tekočin, kot sta sok ali čaj (150 ml), priporočljivo v enem odmerku zjutraj.

Otroci, stari od 2 do 3 leta:

- 10–15 ml raztopine na dan s kozarcem vode ali drugih tekočin, kot sta sok ali čaj (150 ml), priporočljivo v enem odmerku zjutraj.

Dojenčki, stari od 6 mesecev do 1 leta

(s telesno maso > 7 kg):

- 5–10 ml raztopine na dan s kozarcem vode (50 ml), priporočljivo v enem odmerku zjutraj.

Odmerno posodico po uporabi sperite s toplo vodo iz pipe in je ne vračajte v škatlo dokler se ne posuši. Pri otrocih, mlajših od 12 let, je uporaba priporočljiva pod zdravniškim nadzorom. Medicinskega pripomočka WAYA Lax® Junior peroralna raztopina ne uporabljajte več kot 30 zaporednih dni. Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom.

3. INTERAKCIJE

Ni znanih interakcij z zdravili, vendar je ta pripomoček priporočljivo vzeti vsaj 2 uri pred jemanjem zdravil ali vsaj 2 uri po njej, saj lahko osmotsko delovanje makrogola in pospešena hitrost prehoda skozi

prebavila neželjeno učinkujeta na njihovo učinkovitost. Zato se pred uporabo medicinskega pripomočka WAYA Lax® Junior peroralna raztopina posvetujte z zdravnikom, če jemljete kakšna zdravila. WAYA Lax® Junior lahko povzroči medsebojni učinek, če ga uporabljamo s sredstvi za zgostitev na osnovi škroba.

Sestavina makrogol preprečuje zgoščevalni učinek škroba in učinkovito utekočini pripravke, ki bi morali ostati gosti za ljudi s težavami pri požiranju.

4. ZNANI NEŽELENI UČINKI

Ta medicinski pripomoček bolniki dobro prenašajo, saj je njegov učinek fizikalen/mehanski in ni odvisen od sistemske absorpcije.

Med njegovo uporabo se lahko pojavijo neželeni učinki, kot so razdražen želodec (dispepsija), bolečina ali kruljenje v želodcu, otekanje, vetrovi, slabost, bruhanje, draženje zadnjika in blaga driska. Ti učinki se izboljšajo, ko zmanjšate odmerek. Če opazite alergijsko reakcijo, prekinite uporabo medicinskega pripomočka in se obrnite na zdravnika. Če se pojavi kakršen koli neželeni učinek, o tem obvestite zdravnika ali farmacevta.

5. POGOJI SHRANJEVANJA

Rok uporabnosti je naveden na škatli in nalepki ter velja, če je ovojnina izdelka neoporečna in se izdelek pravilno shranjuje. Medicinskega pripomočka ne uporabite po datumu izteka roka uporabnosti ali če je ovojnina odprta ali poškodovana. Medicinski pripomoček shranjujte tesno zaprt na hladnem in suhem mestu, zaščitenem pred svetlobnimi ter toplotnimi viri. Medicinski pripomoček WAYA Lax® Junior peroralna raztopina uporabite v 3 mesecih po odprtju. Ne shranjujte v hladilniku.

6. OPOZORILO

Med nosečnostjo in dojenjem se pred uporabo tega medicinskega pripomočka posvetujte z zdravnikom. Pripomoček shranjujte nedosegljivo otrokom! Preprečite stik z očmi. Medicinskega pripomočka ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti. Ne uporabite, če je ovojnina poškodovana. Pred uporabo medicinskega pripomočka WAYA Lax® Junior peroralna raztopina za primer fekaloma se posvetujte z zdravnikom.

7. ODSTRANJEVANJE

Z izdelkom, ki mu je pretekel rok uporabnosti ali ki ga je treba zavreči, je treba ravnati skladno s predpisi lokalnega pristojnega organa za ravnanje z odpadki. Izdelka in njegove ovojnine ne smete sprostiti v okolje.




Proizvajalec:

Pharma Line S.r.l.
Via Bertani, 2 – 20154 Milano, Italija

Distributer:

Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, Ljubljana

Datum revizije navodila: december 2021



 **MEDIS**